

COMAGRO

Agente Complejante: Ácidos Carboxilicos

Cultivo	Dosis (L/ha)	Observaciones
Uva de mesa Vid vinífera		Aplicar en inicio de actividad radicular, normalmente coincide con plena flor o inicio de cuaja.
Cerezo, Ciruelo, Nectarin, Duraznos, Almendro, Nogal, Avellano Europeo	15 - 20	Aplicar en inicio de actividad radicular o primeros riegos de la temporada. La aplicación debe estar hecha antes que el brote tenga el "pick" de crecimiento.
Pomaceas		Aplicar en frutos recién cuajados o a inicio de crecimiento de frutos.
Frambuesa, Arándanos Frutillas, Mora		Aplicar desde inicio de cuaja hasta pre-cosecha. Repetir cada 10 días.
Hortalizas	15 - 20	Aplicar desde 2 a 3 hojas verdaderas.

pH (0,2% a 20°C) 4,50 Densidad (20°C) 1,23 -1,33 a 20°C Solubilidad >200 g/L a 20°C



PRECAUCIONES

- Fertilizante de baja toxicidad, se sugiere usar medidas de protección propias de un fitosanitario.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.
- Mantener el envase cerrado mientras no esta siendo usado.
- No almacenar en temperaturas de congelamiento ni temperaturas superiores a 43°C.
- Inutilizar los envases de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes.
- No trasportar ni almacenar con alimentos, no lavar envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua, guardar en lugar fresco y seco.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

QUETION Ca SOIL no es compatible con productos que contengan fosfatos y productos de fuerte reacción alcalina.















IMPORTADO Y DISTRIBUIDO Importado y distribuido por Comagro SPA. contacto@comagrochile.cl www.comagrochile.cl Fabricado por Uvio R&D, España.





