



BROTUVIO

BROTUVIO es un potente bioestimulante activador del sistema inmunológico de la planta. Corresponde a una mezcla de extractos vegetales y nutrientes cuyo complejante actúa como un potente elicitador. Está especialmente recomendado en situaciones de estrés abiótico, tales como altas y bajas temperaturas, estrés hídrico, estrés salino y fiebre de primavera. Promueve la fotosíntesis y procesos fisiológicos esenciales para un buen desarrollo vegetativo y de frutos.

En período de postcosecha BROTUVIO mantiene las plantas con mayor actividad metabólica, impactando positivamente en la acumulación de arginina en estructuras de reserva.

BROTUVIO se absorbe rápidamente vía hojas, tallos y raíces.

BROTUVIO es traslocado muy fácilmente por la planta, asegurando un movimiento ascendente y descendente.

Aplicación
Foliar



Aplicación
Radicular



INGREDIENTE ACTIVO

Nitrógeno + Cobre Manganese
Zinc



FORMULACIÓN

Concentrado
Soluble (SL)



ELEMENTO

Nitrogeno (N)
Cobre (Cu)
Manganeso (Mn)
Zinc (Zn)



CONCENTRACIÓN

5,00 % p/p (50 g/Kg)
1,75% p/p (17,5 g/Kg)
0,75 % p/p (7,5 g/Kg)
0,50 % p/p (5 g/Kg)

Agente Complejante: Ácidos Lignosulfónicos

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis (cc/100 L)	Dosis (L/ha)	Observaciones
Cerezo Carozos (excepto ciruelo) Cítricos Paltos Kiwi Nogal Pomáceas Uva de mesa Vid vinífera Avellano Europeo	250 - 300	3- 4	Aplicar desde brotación hasta post-cosecha (sin límite de aplicaciones), bajo cualquier situación de estrés, fiebre de primavera, intoxicaciones o para sustentar altas exigencias de los cultivos. Normalmente se recomienda aplicar con brotes de 10 a 15 cm y repetir a los 7 días (mínimo de 2 aplicaciones). También se puede aplicar junto a reguladores de crecimiento. Mojamiento: 1.000 a 1.500 L/ha de agua, dependiendo de la especie y estado fenológico. Aplicación vía riego 4 a 6 L/ha
Plantas en formación	250 - 300	-	Aplicar con buen mojamiento, cada 7 a 10 días. Excelente complemento a reguladores de crecimiento utilizados para la inducción de ramas laterales.
Frambuesa, Arándanos Frutillas, Mora	250 - 300	1,5 - 2,5	Aplicar desde brotación hasta post-cosecha (sin límite de aplicaciones), bajo cualquier situación de estrés, fiebre de primavera, intoxicaciones o para sustentar altas exigencias de los cultivos. Aplicación vía riego 3 a 5 L/ha
Hortalizas	250 - 300	1 - 2,5	Aplicar desde trasplante a cosecha. Aplicación vía riego 3 a 5 L/ha

METALES PESADOS

Plomo (Pb)	<2,0 ppm
Arsénico (As)	<2,0 ppm
Cadmio (Cd)	<0,5 ppm
Mercurio (Hg)	<0,2 ppm

pH(al 0,2% a 20 °C)	5,00
Densidad	1,10 - 1,20
Solubilidad	100%



BROTVIO

PRECAUCIONES

Aplicar vía foliar asegurando una buena homogeneidad de la solución.

Aplicar vía riego con sistemas tecnificados (goteros o microaspersores).

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con aceites, aminoácidos, azufres, cobres, captan y productos en base a zinc. Ante cualquier duda, efectuar una prueba de compatibilidad previa.

TIEMPO DE REINGRESO

Sin restricciones. pequeña escala para observar los aspectos físicos de la mezcla.

PRESENTACIÓN



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO

Importado y distribuido por Comagro SPA.

contacto@comagrochile.cl

www.comagrochile.cl

Fabricado por Uvivo R&D, España.

