



UVIAMIN 14

UVIAMIN 14 ES UN FERTILIZANTE FOLIAR Y CORRECTOR NUTRICIONAL 100% SOLUBLE, FORMULADO EN BASE A L- α -AMINOÁCIDOS LIBRES DE ALTA CONCENTRACIÓN, LO QUE PERMITE UNA MAYOR DISPONIBILIDAD Y RÁPIDA ABSORCIÓN POR PARTE DE LA PLANTA

ADEMÁS DE INCORPORAR GLICINA BETAÍNA APORTANDO UN EFECTO OSMOPROTECTOR A NIVEL CELULAR.

Aplicación
Foliar



Aplicación
Radicular



INGREDIENTE ACTIVO

Aminoácidos



FORMULACIÓN

Concentrado
Soluble (SL)



ELEMENTO

Aminoácidos Libres
Nitrógeno Total
Glicina Betaina



CONCENTRACIÓN

13,3 % p/p (132 g/Kg)
2,5% p/p (25,9 g/Kg)
10.000 ppm

Cultivo	Dosis	Observaciones
Cerezo, Nectarín, Duraznos, Almendro, Nogal, Avellano Europeo	200 - 300 cc/100 L agua	Aplicar en los momentos críticos: pre-floración, caída de pétalos, crecimiento de fruto.
	400 - 600 cc/100 L agua	Aplicar para recuperar plantas dañadas por heladas, granizo, viento, insectos, etc.
Cítricos	250 - 300 cc/100 L agua	Aplicar durante el crecimiento vegetativo y en post-cuaja.
	400 - 600 cc/100 L agua	Aplicar para recuperar plantas dañadas por heladas.
Olivo	200 - 300 cc/100 L agua	Aplicar para recuperar plantas dañadas por heladas, granizo, viento, insectos, etc.
Hortalizas	200 - 300 cc/100 L agua	Aplicar 3 a 5 días después del trasplante y repetir 2 a 3 veces cada 15 a 20 días.
Cereales	3 - 5 L/ha	Aplicar antes de macolla, a inicios de macolla y en post-macolla.
Maíz	2 - 3 L/ha	Aplica con 2 a 3 hojas y repetir 15 días después.
Papa	2 - 3 L/ha	Aplicar en pre-floración y post-floración.
Remolacha	2 - 3 L/ha	Aplicar con 3 a 5 hojas y repetir cada 20 a 30 días durante el ciclo del cultivo.
Ornamentales	200 - 300 cc/100 L agua	Aplicar 3 a 4 veces durante el ciclo del cultivo, cada 10 - 15 días.
Manzanos y Perales	200 - 300 cc/100 L agua	Aplicar en los momentos críticos: pre-floración, caída de pétalos, crecimiento de fruto.

METALES PESADOS	Plomo (Pb)	< 2,0 ppm
	Arsénico (As)	< 2,0 ppm
	Cadmio (Cd)	< 0,5 ppm
	Mercurio (Hg)	< 0,2 ppm

Ph (0,2%)	6,9
Densidad	1,20
Solubilidad	>200 g/L a 20° C



UVIAMIN 14

PRECAUCIONES

- Fertilizante de baja toxicidad, se sugiere usar medidas de protección propias de un fitosanitario.
- Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas.
- Mantener el envase cerrado mientras no esta siendo usado.
- No almacenar en temperaturas de congelamiento ni temperaturas superiores a 43°C.
- Inutilizar los envases de acuerdo con las instrucciones de las autoridades competentes.
- No trasportar ni almacenar con alimentos, no lavar envases o equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua, guardar en lugar fresco y seco.
- No aplicar en Ciruelo.

UVIAMIN 14 podría aumentar la absorción de productos acompañantes en la mezcla.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se usa de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta.

COMPATIBILIDAD

UVIAMIN 14 NO ES COMPATIBLE junto a derivados cúpricos, aceites minerales o azufre.



PRESENTACIÓN



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO

Importado y distribuido por Comagro SPA.

contacto@comagrochile.cl

www.comagrochile.cl

Fabricado por Uvio R&D, España.

